

疫苗信息声明

RSV (呼吸道合胞病毒) 疫苗： 须知事宜

1. 为何接种疫苗？

RSV (呼吸道合胞病毒) 可以预防由**呼吸道合胞病毒 (RSV)** 引起的下呼吸道疾病。RSV 是一种常见的呼吸道病毒，通常会引起轻度感冒样症状。

RSV 可导致所有年龄段的人患病，但对婴儿和老年人来说可能尤其严重。

- RSV 是导致美国婴儿住院治疗的最常见原因。12 个月以下的婴儿（尤其是 6 个月及以下的婴儿）和早产儿童，或患有慢性肺部或心脏病或免疫系统较弱的儿童，患严重呼吸道合胞病毒疾病的风险增加。
- RSV 感染对某些成人来说可能很危险。患上重度 RSV 疾病风险最高的成人包括老年人，尤其是患有慢性心脏或肺部疾病、免疫系统较弱、某些其他慢性疾病或居住在疗养院的老年人。

RSV 通过直接接触病毒传播，例如当感染者咳嗽或打喷嚏时产生的飞沫接触到您的眼睛、鼻子或嘴巴。如果某人触摸带有病毒的表面（如门把手），然后触摸脸部，也可能传播病毒。

RSV 感染的症状可能包括流鼻涕、食欲下降、咳嗽、打喷嚏、发热或喘鸣。在非常年幼的婴儿中，RSV 的症状还可能包括易激惹（烦躁）、活动减少或呼吸暂停（呼吸暂停超过 10 秒）。

大多数人在一两周内就会康复，但 RSV 可能更严重，会导致呼吸急促和低氧水平。RSV 可引起细支气管炎（肺部小气道炎症）和肺炎（肺部感染）。RSV 还会导致其他疾病恶化，如哮喘、慢性阻塞性肺病（一种使人呼吸困难的慢性肺部疾病）或心力衰竭（心脏无法向全身泵出足够的血液和氧气）。

因 RSV 而病重的婴儿和老年人可能需要住院治疗。有些人甚至可能会死。

Many Vaccine Information Statements are available in Simplified Chinese and other languages. See www.immunize.org/vis

许多疫苗信息声明均提供简体中文和其他语言的版本。请参阅 www.immunize.org/vis

2. RSV 疫苗

预防婴儿感染 RSV 的免疫接种方案有两种：孕妇接种疫苗或婴儿接种预防性抗体。大多数婴儿只需要其中一个方案就能得到保护。

美国疾病控制与预防中心 (CDC) 建议为**妊娠第 32 周至第 36 周的孕妇**接种一次性 RSV 疫苗，以预防她们的婴儿在出生后 6 个月内患上 RSV 疾病。对于美国大多数人，建议在 9 月至来年 1 月期间接种此疫苗。然而，在某些地区（例如，夏威夷、阿拉斯加和佛罗里达州的部分地区），疫苗接种时间可能会根据一年中 RSV 在该地区传播的时间而有所不同。

CDC 建议**75 岁及以上的所有人以及患上重度 RSV 疾病风险增加的 60 至 74 岁的成人接种一次性 RSV 疫苗**。患病风险增加的 60 至 74 岁的成人包括患有慢性心脏或肺部疾病、免疫系统较弱、某些其他慢性疾病的成人，以及居住在疗养院的成人。

RSV 疫苗可与其他疫苗同时接种。

3. 请咨询您的医务人员

如果准备接种疫苗者有以下情况，请告诉您的疫苗接种服务提供者：

- **之前注射过 RSV 疫苗后出现过过敏反应，或有任何严重的、危及生命的过敏反应**

在某些情况下，医务人员可能会决定将 RSV 疫苗接种推迟至下次就诊。

患有诸如感冒等轻微疾病的人可以接种疫苗。但对于患有中度或重度疾病的人，应当等康复后再接种 RSV 疫苗。

您的医务人员可向您提供更多信息。



**U.S. CENTERS FOR DISEASE
CONTROL AND PREVENTION**

4. 疫苗反应的风险

- 接种 RSV 疫苗后可能会出现注射部位疼痛、红肿、疲劳（感觉疲倦）、发烧、头痛、恶心、腹泻、肌肉或关节疼痛等症状。

一些老年人在接种 RSV 疫苗后曾报告出现严重的神经系统疾病，包括吉兰-巴雷综合征 (GBS)。目前，尚无法证实或排除 60 岁及以上人群接种 RSV 疫苗后发生 GBS 的风险增加的可能性。

接种 RSV 疫苗的孕妇中曾报告过早产和妊娠期高血压，包括先兆子痫。目前尚不清楚这些事件是否由疫苗引起。

人们有时会在接受医疗程序（包括疫苗接种）后昏厥。如果您感到头晕或视力发生变化或出现耳鸣，请告诉您的医务人员。

和使用任何药物一样，接种疫苗有可能造成严重的过敏反应、其它严重损伤或死亡，但是可能性极小。

V-Safe 是一种安全监测系统，可让您与 Centers for Disease Control and Prevention (美国疾病控制与预防中心, CDC) 分享您或您的家属接种 RSV 疫苗后的感受。您可以在 vsafe.cdc.gov 上查找信息并注册 V-Safe。

5. 如果出现严重问题怎么办？

过敏反应可能会在接种疫苗者离开诊所后发生。如果您注意到严重过敏反应的体征（荨麻疹、面部和喉咙肿胀、呼吸困难、心跳加快、头晕或无力），请致电 9-1-1，并将该人士送到最近的医院。

如出现其他让您担心的体征，请致电您的医务人员。

应将不良反应报告给 Vaccine Adverse Event Reporting System (VAERS, 疫苗不良事件报告系统)。您的医务人员通常会提交这份报告，或者您可以自己来提交。请访问 VAERS 网站

www.vaers.hhs.gov，或致电 1-800-822-7967。

VAERS 仅用于报告反应，VAERS 工作人员并不给予医疗建议。

6. 我如何获得更多的信息？

- 请询问您的医务人员。
- 致电您当地或州健康部门。
- 请浏览 Food and Drug Administration (美国食品药品监督管理局, FDA) 网站，以获取疫苗药品说明书和附加的信息，网址为 www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines
- 请联系 Centers for Disease Control and Prevention (美国疾病控制与预防中心, CDC)：
 - 致电 1-800-232-4636(1-800-CDC-INFO)
 - 访问 CDC 网站：www.cdc.gov/vaccines

