

## ویکسین سے متعلق معلومات کا بیان

Many Vaccine Information Statements are available in Urdu and other languages. See [www.immunize.org/vis](http://www.immunize.org/vis)

ُنیکے کی معلومات کے بہت سارے بیانات اردو اور دوسرا زبانوں میں دستیاب ہیں۔ کریں [www.immunize.org/vis](http://www.immunize.org/vis)

# RSV (سانس کے کثیر نواتی خلیوں کے وائرس) کی ویکسین: آپ کو کیا جانے کی ضرورت ہے

## RSV.2 ویکسین

RSV سے نوزائیدہ بچوں کے تحفظ کے لیے دو اختیارات ہیں: حاملہ خاتون کے لیے زچگی کی ویکسین اور بچے کو دی جانے والی حفاظتی اینٹی باڈیز۔ زیادہ تر بچوں کی حفاظت کے لیے ان میں سے صرف ایک اختیار کی ضرورت ہے۔

CDC حاملہ خواتین کے لیے حمل کے 32 سے 36 ویں بھتے تک ویکسین کی ایک خواراک تجویز کرتا ہے تاکہ ان کے بچوں میں زندگی کے پہلے 6 ماہ کے دوران RSV کی بیماری سے بچایا جا سکے۔ یہ ویکسین زیادہ تر ریاستہائے متحده امریکہ میں ستمبر سے جنوری تک دینے کی سفارش کی جاتی ہے۔ تاہم، کچھ مقامات پر (مثال کے طور پر، علاقوئے، بوائی، الاسکا، اور فلوریڈا کے کچھ حصے)، ویکسینیشن کا وقت سال کے اس وقت کی بنیاد پر مختلف ہو سکتا ہے جب RSV علاقوئے میں گردش کرتا ہے۔

CDC 75 سال اور اس سے زیادہ عمر کے اور 60 سے 74 سال کی عمر کے بالغ افراد کے لیے RSV ویکسین کی ایک بار کی خواراک کی سفارش کرتا ہے جن کو RSV کی شدید بیماری ہے۔ 60 سے 74 سال کی عمر کے بالغ افراد میں وہ لوگ شامل ہیں جن کو دل یا پھیپھڑوں کی دامنی بیماری ہے، وہ لوگ جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے، یا کچھ دیگر طویل مدتی طبی حالات ہیں، اور وہ لوگ جو نرسنگ بومز میں رہتے ہیں۔

RSV کی ویکسین دوسری ویکسین کے ساتھ ایک بی وقت میں دی جا سکتی ہے۔

## 3. اپنے نگہداشت صحت فراہم کرننے سے بات کریں

اپنے ویکسین فراہم کرننے کو بتائیں اگر ویکسین لینے والے فرد کو RSV کی ویکسین کی پچھلی خواراک کے بعد الرجی زا دفعہ عمل بوا ہو، یا کوئی شدید، جان لیوا الرجیاں ہوں

کچھ معاملات میں، آپ کا نگہداشت صحت فراہم کرننے مستقبل کی کسی ملاقات تک RSV ویکسینیشن کو ملتوي کرنے کا فیصلہ کر سکتا ہے۔ زلے جیسی معمولی بیماریوں میں مبتلا افراد کو، ویکسین دی جا سکتی ہے۔ جو لوگ تھوڑے بہت یا شدید بیمار ہیں انہیں عام طور پر RSV ویکسین لگوانے سے پہلے صحت یاب ہونے تک انتظار کرنا چاہیے۔

آپ کا نگہداشت صحت فراہم کرننے آپ کو مزید معلومات فراہم کر سکتا ہے۔

## 1. ویکسین کیوں لگوائیں؟

RSV ویکسین سانس کی نالی کے نچلے حصے کی بیماری کا تدارک کر سکتی ہے جو سانس کے کثیر نواتی خلیوں کے وائرس (RSV) کی وجہ سے ہوتی ہے۔ RSV سانس کا ایک عام وائرس ہے جو عموماً معمولی، نزلے جیسی علامات کا سبب بنتا ہے۔

بر عمر کے لوگوں میں بیماری کا سبب بن سکتا ہے لیکن خاص طور پر بچوں اور بزرگوں کے لیے سنگین ہو سکتا ہے۔

- RSV امریکی شیرخوار بچوں میں بسپتال میں داخل ہونے کی سب سے عام وجہ ہے۔ 12 ماہ تک کے شیرخوار بچوں (خاص طور پر جو 6 ماہ اور اس سے کم عمر ہیں) اور ان بچوں میں جو وقت سے پہلے پیدا ہوئے تھے، یا جن کو پھیپھڑوں یا دل کی دامنی بیماری ہے یا جن کا مدافعتی نظام کمزور ہے، شدید RSV بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔

- RSV انفیکشن بعض بالغوں کے لیے خطروناک ہو سکتا ہے۔ شدید RSV بیماری کے لیے سب سے زیادہ خطروے والے بالغوں میں بزرگ افراد، خاص طور پر وہ لوگ جو دل یا پھیپھڑوں کی دامنی بیماری، کمزور مدافعتی نظام، بعض دیگر دامنی طبی حالات، یا نرسنگ بومز میں رہنے والے شامل ہیں۔

واہر کے ساتھ براہ راست رابطے سے پہلیا ہے، جیسے کسی دوسرے متاثرہ شخص کی کہانی یا چہینک سے آنے والی چھینکوں کا آپ کی آنکھوں، ناک یا منہ پر گرنا۔ یہ کسی ایسی سطح جس پر واہر موجود ہو، جیسے دروازے کی بہتی، کو چھوٹے اور پھر اپنے چہرے کو چھوٹے سے بھی پھیل سکتا ہے۔

RSV انفیکشن کی علامات میں ناک ہینا، بھوک کا کم بونا، کھانسی، چھینکیں، بخار، یا سینے میں خرخراہٹ شامل ہو سکتے ہیں۔ بہت چھوٹے بچوں میں، RSV کی علامات میں جڑچڑاپن (پریشانی)، سستی، یا اپنی (سانس لینے میں 10 سیکنڈ سے زیادہ وقفہ) بھی شامل ہو سکتا ہے۔

زیادہ تر لوگ ایک یا دو بفتون میں شفایاپ ہو جاتے ہیں، لیکن RSV سنگین بو سکتا ہے، جس کے نتیجے میں سانس لینے میں دشواری اور آکسیجن کی سطح کم ہو جاتی ہے۔ RSV برونوکیولاٹس (نرخرے کی نالیوں کی سوژش) اور نمونیا (پھیپھڑوں کے انفیکشن) کا سبب بن سکتا ہے۔ RSV بعض اوقاں دیگر طبی حالتوں جیسے دمہ، پھیپھڑوں کے دامنی مزاحمتی مرض (پھیپھڑوں کی ایک دامنی بیماری جس سے سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے) کی خرابی، یا دل کی ناکامی (جب دل جسم میں کافی خون اور آکسیجن پمپ نہیں کر سکتا) کا باعث بن سکتا ہے۔

بزرگ اور شیرخوار بچے جو RSV سے بہت بیمار ہوتے ہیں انہیں بسپتال میں داخل ہونے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ حتیٰ کہ کچھ مر بھی سکتے ہیں۔



U.S. CENTERS FOR DISEASE  
CONTROL AND PREVENTION

## 5. اگر کوئی سنگین مسئلہ ہو تو کیا ہو گا؟

ویکسین لگائے گئے شخص کے کلینک سے نکلنے کے بعد الرجی زا رِد عمل بو سکتا ہے۔ اگر آپ کو شدید الرجی زا رِد عمل کی علامات نظر آئیں (چھپاک، چہرے اور گلے میں سوجن، سانس لینے میں دشواری، دل کی تیز ہڑکن، چکر آنا، یا کمزوری)، تو **1-800-7967-822-1** پر کال کریں اور اس شخص کو قریبی بسپتال لے جائیں۔

دیگر ایسی علامات، جو آپ کے لیے تشویش کا باعث ہوں، کے لیے اپنے نگہداشت صحت فراہم کننہ کو کال کریں۔

منفی رِد عمل کی اطلاع ویکسین کے ناموفق واقعہ کے روپرٹنگ سسٹم (Vaccine Adverse Event Reporting System, VAERS) کو دی جانی چاہیے۔ آپ کا نگہداشت صحت فراہم کننہ عام طور پر یہ رپورٹ درج کرائے گا، یا آپ خود بھی کرا سکتے ہیں۔ VAERS ویب سائٹ [www.vaers.hhs.gov](http://www.vaers.hhs.gov) پر دیکھیں یا **1-800-7967-822-1** پر کال کریں۔ VAERS صرف رِد عمل کی اطلاع دینے کے لیے ہے، اور VAERS کے عملے کے اراکین طبی مشورہ نہیں دیتے ہیں۔

## 6. میں مزید کیسے جان سکتا ہوں؟

- اپنے نگہداشت صحت فراہم کننہ سے پوچھیں۔
- اپنے مقامی یا ریاستی محکمہ صحت کو کال کریں۔
- ویکسین پیکچ کی پرچی اور اضافی معلومات کے لیے فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن (FDA) کی ویب سائٹ یہاں ملاحظہ کریں [www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines](http://www.fda.gov/vaccines-blood-biologics/vaccines)
- بیماریوں کے کنٹرول اور روک تھام کے مراکز (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) سے رابطہ کریں: کال کریں **(1-800-CDC-INFO) 1-800-232-4636** پر یا [www.cdc.gov/vaccines](http://www.cdc.gov/vaccines) کی ویب سائٹ CDC -

## 4. ویکسین کے رِد عمل کے خطرات

▪ ٹیکہ لگانے کی جگہ پر درد، لالی، اور سوجن بو جانا، RSV ویکسینیشن کے بعد تھکاوٹ (نہکا بوا محسوس کرنا)، بخار، سر درد، متلی، اسہال، اور پیٹوں یا جوڑوں کا درد بو سکتا ہے۔

سنگین اعصابی حالات، بشمول Guillain-Barré syndrome (GBS) کے بعد واقع ہوئے ہیں۔ اس وقت، 60 سال یا اس سے زیادہ عمر کے افراد میں RSV ویکسین کے بعد GBS کے بڑھتے ہوئے خطرے کی تصدیق یا انکار نہیں کیا جا سکتا۔

قبل از وقت پیدائش اور حمل کے دوران بائی بلڈ پریشر، بشمول پری ایکلیمپسیا، حاملہ خواتین میں رپورٹ کیا گیا ہے جنہوں نے طبی آزمائشوں کے دوران RSV ویکسین حاصل کی تھی۔ یہ واضح نہیں ہے کہ آیا یہ واقعات ویکسین کی وجہ سے ہوئے تھے۔

لوگ بعض اوقات طبی طریقہ کار، بشمول ویکسینیشن کے بعد بیووش بو جاتے ہیں۔ اگر آپ کو چکر آ رہے ہیں یا آپ کی بصارت میں تبدیلی آئی ہے یا کانوں میں گھنٹیاں بج رہی ہیں تو اپنے فراہم کننہ کو بتائیں۔

کسی بھی دوا کی طرح، ویکسین کے شدید الرجی زا رِد عمل، دیگر سنگین چوٹ، یا موت کا باعث بننے کا بہت کم امکان بوتا ہے۔

V-safe ایک حفاظتی نگرانی والا نظام ہے جو آپ کو CDC کے ساتھ اشتراک کرنے دیتا ہے کہ آپ، یا آپ کے منحصر، RSV ویکسین لینے کے بعد کیسا محسوس کرتے ہیں۔ آپ معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور V-Safe پر [vsafe.cdc.gov](http://vsafe.cdc.gov) میں اندرج کر سکتے ہیں۔

